


# OZONO ESTRATOSFÉRICO Y RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

BOLETÍN ANUAL

AÑO  
2022



## Índice

	Pág.
<b>1. Resumen.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Introducción.....</b>	<b>4-5</b>
<b>3. Monitoreo del agujero de ozono antártico.....</b>	<b>6-7-8</b>
<b>4. Consecuencias del agotamiento del ozono en la radiación UV.....</b>	<b>9</b>
<b>5. Observaciones generales.....</b>	<b>10</b>
<b>6. Referencias.....</b>	<b>11</b>

### ¿Cómo comunicarte con nosotros?

Sitio web: [www.meteochile.gob.cl/climatologia](http://www.meteochile.gob.cl/climatologia)

Correo: [servicios\\_climatologicos@meteochile.cl](mailto:servicios_climatologicos@meteochile.cl)

### Información importante

Los datos usados para este boletín son provenientes de satélites de la NASA. Para mayor información se puede visitar <https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/>. También, información relevante es obtenida de COPERNICUS. Puedes encontrar mas detalles en <https://atmosphere.copernicus.eu/monitoring-ozone-layer>

**Boletín diseñado y elaborado por el meteorólogo Juan Crespo.**  
**Boletín editado por la meteoróloga y Jefa de la Of. De Servicios Climáticos Catalina Cortés.**

© Dirección Meteorológica de Chile - Dirección General de Aeronáutica Civil  
 Avenida Portales 3450, Estación Central, Santiago.



/meteochiledmc



@meteochile\_dmc



@meteochile



**Meteochile Blog**

Blog oficial de la Dirección Meteorológica de Chile

# OZONO ESTRATOSFÉRICO Y RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

## AÑO 2022

### 1. Resumen

Al igual que los años 2020 y 2021, el agujero de ozono 2022 resaltó por su gran tamaño y duración más extensa de lo normal (desde principios de agosto a fines de diciembre), esto debido a las condiciones físicas y dinámicas de la estratosfera que permitieron que adquiriera estas características (Figura 1). Por su parte, los valores de mínimo de columna de ozono (Figura 2) se mantuvieron por debajo del promedio 1979-2022 desde septiembre en adelante.

Las temperaturas de formación de las nubes estratosféricas polares (NEPs), tanto para las de Tipo I como de Tipo II, estuvieron por debajo de valores medios para el período 1979 – 2022, entre agosto y diciembre, y siendo muy bajas para la época entre octubre y noviembre, favoreciendo la formación de NEPs por más tiempo de lo normal.

La corriente en chorro polar en tanto, principal factor de aislamiento del aire polar y fortalecimiento del vórtice, presentó intensidades superiores a la media desde julio hasta diciembre. A su vez, el transporte longitudinal de calor en 100 hPa, entre los 45° y 75°S, fue muy débil, lo que se tradujo en un vórtice estable y de larga duración.

Dado las condiciones señaladas, **la extensión del área del Agujero de Ozono fue mayor y también tuvo un tardío cierre (similar a lo ocurrido en 2020 y 2021)**, llegando a los 25 millones de Km<sup>2</sup> aproximadamente en septiembre y octubre, y manteniendo una extensión cercana a los 20 millones de Km<sup>2</sup> hasta fines de noviembre (Figura 3). Esta situación, ubica el **Agujero de Ozono de 2022 como uno de los más grandes y duraderos de los últimos años**.

Pese a que el Agujero de Ozono Antártico del año 2022 presentó valores de gran tamaño, duración y profundidad, su efecto en el país fue marginal. En septiembre y noviembre el aumento en los valores del Índice Ultravioleta (IUV) en las ciudades del extremo sur del país, están asociados a las condiciones naturales para la época, es decir, acorde a la estacionalidad. Sin embargo, un leve aumento de IUV se vivió los días 11 y 12 de octubre por una elongación del agujero.




Figura 1. Tamaño del agujero de ozono en millones de km<sup>2</sup>.  
Fuente: NASA.




Figura 2. Mínimo de columna de ozono en unidades Dobson (DU).  
Fuente: NASA.




Figura 3. Agujero de Ozono el día 15 de octubre de 2022. Fuente: Programa Copernicus.

## 2. Introducción

Las observaciones atmosféricas de mediados de la década de 1970, permitieron constatar la disminución primaveral de la capa de Ozono Antártico, denominada en los años siguientes como agujero de la capa de ozono (Figura 4). Las altas concentraciones de clorofluorocarbonos y otros contaminantes atmosféricos agotadores del ozono estratosférico, conocidos como SAOs, fueron los principales responsables de este efecto.




Figura 4. Columna de ozono total. Fuente: NASA.

La pérdida global de ozono estratosférico genera un incremento importante en la incidencia de los Rayos UV y el consiguiente incremento en las afecciones a la piel.

En respuesta a este problema, los gobiernos de diferentes países del mundo firmaron en 1987 el Protocolo de Montreal, como un compromiso global basado en normativas para el control del uso de las sustancias químicas nocivas para la capa de ozono. Este acuerdo internacional ha sido exitoso, ya que las medidas aplicadas han permitido avanzar en la recuperación de la capa de Ozono, como se puede constatar en el informe conjunto desarrollado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente “Evaluación científica de la disminución del Ozono, año 2014”, donde se prevé una recuperación total alrededor del año 2050.

El protocolo de Montreal ha sido revisado y modificado en la reunión realizada en Kigali, Ruanda (2016), a través de la llamada “Enmienda de Kigali” que busca reducir los hidrofluorocarbonos (HCFC) al año 2025. Chile ha sido el séptimo país del mundo en ratificar esta enmienda, iniciando su puesta en marcha el 1 de enero de 2019.

El presente boletín muestra los resultados de las observaciones realizadas por la NASA, el Instituto Real de Meteorología de Holanda (KNMI) y la información de radiación ultravioleta medida por las estaciones del sur y extremo sur del país.

### Capa de ozono, radiación UV y su interacción

El ozono es un gas inerte, que está presente en forma natural en la atmósfera. Fue descubierto en 1840 por el químico alemán Friedrich Shönbein, por medio de descargas eléctricas en el aire. Su nombre proviene del vocablo griego ὥξειν (ozein), que significa oler. Es de muy baja concentración, solo se pueden observar 3 moléculas de ozono por millón de moléculas de aire.

El ozono posee dos caras, una “buena” y una “mala”. El bueno se concentra en la estratosfera, entre los 10 y los 50 Km, con un máximo alrededor de los 30 km, zona conocida como Capa de Ozono. Esta es responsable de filtrar el 90% de la Radiación Ultravioleta más nociva para la vida en la tierra (Figura 5).

El ozono conocido como malo, en tanto, se concentra en la tropósfera, la capa atmosférica más cercana a la superficie, representando el 10% restante. A este nivel es un gas tóxico para la salud humana. Se genera esencialmente de la contaminación vehicular.

# OZONO ESTRATOSFÉRICO Y RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

## AÑO 2022




Figura 5. Perfil de ozono atmosférico. Fuente: NOAA.

### Formación del ozono

El ozono se forma naturalmente en la estratosfera, a través de una serie de reacciones fotoquímicas en la que los rayos solares ultravioleta rompen la molécula de oxígeno( $O_2$ ) para producir 2 átomos de oxígeno ( $2O$ ). Luego, cada átomo se combina con una molécula de oxígeno para producir una molécula de ozono ( $O_3$ ). (Figura 6)




Figura 6. Esquema de formación del ozono atmosférico. Fuente: NOAA.

Estas reacciones se llevan a cabo en forma continua en presencia de radiación ultravioleta; la producción de ozono es balanceada por su destrucción en las mismas reacciones químicas. Este balance está determinado por la cantidad de gases reactivos, compuestos por cloro y bromo principalmente y la efectividad de sus reacciones, que dependen de la intensidad de la radiación solar, ubicación en la atmósfera, temperatura y otros factores. Sin embargo, en la estratosfera existe una gran cantidad de sustancias químicas naturales y generadas por el hombre, principalmente gases compuestos por cloro y bromo, que reaccionan con las moléculas de ozono, destruyéndolas para formar otros compuestos químicos.

### Condiciones necesarias para la formación del agujero de ozono

Para que se produzca el agotamiento de la capa de ozono durante la primavera sobre el Polo Sur se necesitan las siguientes condiciones atmosféricas: Presencia de gases halogenados (CFCs, HCFC), aislamiento de la estratosfera polar (vientos intensos alrededor del Polo), bajas temperaturas en la estratosfera (en consecuencia del aislamiento del polo con latitudes mas bajas donde las temperaturas son mas altas) y formación de Nubes Estratosféricas Polares (NEPs, se forman cuando la temperatura baja de los  $-78^{\circ} C$  y son las principales destructoras del ozono (Figura 7).



Figura 7. Nubes estratosféricas Polares.

### 3. Monitoreo del agujero de ozono Antártico.

#### Anomalía de temperatura y viento en la estratosfera

La figura 8 muestra la anomalía de temperatura en la estratosfera entre septiembre y noviembre de 2022. En ella se observa un marcado núcleo de anomalías negativas sobre la estratosfera polar, justamente sobre territorio antártico. Los valores negativos de anomalía superan los 10°C en el centro del continente antártico. El resto del hemisferio sur también se observó con temperaturas más frías de lo normal, sin embargo estas no fueron tan bajas como sobre el polo. Un núcleo débil de anomalías positivas se alcanza a apreciar cercano al mar de Bellingshausen.




Figura 8. Anomalía de temperatura en los 10 mb durante septiembre, octubre y noviembre de 2022. Período de referencia para el cálculo de anomalía 1991-2020. Fuente: Reanálisis NCEP/NCAR.




Figura 9. Anomalía de viento zonal en los 10 mb durante septiembre, octubre y noviembre de 2022. Período de referencia para el cálculo de anomalía 1991-2020. Fuente: Reanálisis NCEP/NCAR.

La anomalía de viento en 10 mb para el período de septiembre a noviembre de 2022 se puede apreciar en la figura 9. Se distingue un marcado núcleo de anomalías positivas de viento alrededor del polo, esto evidencia que los vientos del oeste están mas intensos de lo normal en esa zona. Los valores positivos de anomalía superan los 20 m/s en el borde del continente antártico. En el resto del hemisferio sur, en latitudes mas bajas, la situación fue diferente ya que se registraron anomalías de viento negativas, lo que significa un debilitamiento de los vientos del oeste.

# OZONO ESTRATOSFÉRICO Y RADIACIÓN ULTRAVIOLETA AÑO 2022

## Temperaturas en la estratosfera

Las temperaturas en la estratosfera polar (Figura 10) superaron su mínimo de invierno durante agosto, pero permanecieron por debajo del umbral de  $-78^{\circ}\text{C}$  para formación de NEPs\* Tipo I hasta inicios de noviembre y del Tipo II entre junio y septiembre. En general las temperaturas estuvieron en torno a valores normales hasta fines de septiembre. Entre octubre y noviembre no aumentaron como lo hacen normalmente, mas bien se mantuvieron por **debajo los valores normales**. En diciembre continuaron bastante bajas hasta mediados de mes, **aunque por momento acercándose a los valores normales para la época**.




Figura 10. Temperatura mínima registrada entre los 50° y 90°S al nivel de 50 hPa (línea roja). Fuente: NASA-MERRA 2.

## Corriente en chorro polar

El continente antártico está rodeado por una fuerte corriente de chorro en la estratosfera (por encima de 12 km o 39.000 pies), que fluye alrededor de la Antártida en el sentido de las agujas del reloj. Esta corriente de chorro aísla el aire sobre la Antártida, del de latitudes medias.

\*NEPs: Nubes Estratosféricas Polares

La región polar delimitada por esta corriente de chorro se denomina *vórtice polar antártico*. Un flujo de chorro más intenso produce un mayor aislamiento del aire polar (disminuye la mezcla), razón por la que el aire dentro del vórtice polar antártico es también mucho más frío que el aire de latitudes medias.

Durante el año 2022 (Figura 11) el viento asociado al chorro polar osciló en rangos esperados hasta el mes de junio, sin embargo, desde julio una tendencia a valores por sobre lo normal permitió **que se alcanzaran registros históricos para la época del año durante los primeros días del mes de noviembre**.




Figura 11. Viento zonal entre los 45° S y 75° S en el nivel de 100 hPa, expresado en m/s. Fuente: NASA

## Estabilidad del vórtice polar

El flujo longitudinal medio de calor, entre los 45° S y los 75° S es un indicativo del grado de perturbación de la atmósfera. En la Figura 12, se puede observar que entre octubre y noviembre, los meses donde se espera un mayor flujo de calor (valores mas negativos), durante el año 2022 no ocurrió. El flujo fue muy débil hacia el vórtice polar (valores menos negativos) desde fines de septiembre hasta comienzos de diciembre, alcanzando, por momentos, valores históricos para la época. **Por lo anterior, y al igual que el 2021, el vórtice tuvo gran estabilidad y mayor duración.**

Otro peak de flujo de calor debilitado se registró en agosto.

# OZONO ESTRATOSFÉRICO Y RADIACIÓN ULTRAVIOLETA AÑO 2022




Figura 12. Flujo longitudinal de calor en el nivel de 100 hPa, expresado en K\*m/s. Mientras mas negativos los valores, mayor flujo de calor. Fuente: NASA

## Déficit de masa de ozono

El déficit de masa de ozono (Figura 13) corresponde a la cantidad de este gas, en millones de toneladas, que es necesario agregar al agujero para alcanzar el valor umbral de 220 UD.

En septiembre, un rápido aumento en el déficit de masa de ozono elevó el valor máximo a 35 millones de toneladas hacia inicios de octubre. Entre mediados de septiembre y fines de noviembre, el déficit de masa de ozono se mantuvo cercano al percentil 90 de los valores climatológicos durante gran parte del tiempo, acercándose a valores históricos durante los primeros días de noviembre.




Figura 13. Déficit de masa de ozono, en unidades de millones de toneladas. Fuente: NASA

## Área y volumen de NEPs

El máximo tamaño de NEPs ocurrió en agosto con cerca de 30 millones de km<sup>2</sup>. Prácticamente durante todo su ciclo, los valores de área de NEPs estuvieron por sobre el promedio, agudizándose este escenario entre julio y agosto (Figura 14). En Agosto, y por momentos, los valores lograron posicionarse, como valores máximos históricos.




Figura 14. Área de Nubes Estratosféricas Polares Tipo I. Fuente: NASA

Al monitorear el volumen NEPs, se observa que se mantuvo cercano a la media de largo plazo hasta el mes de junio, mientras que entre julio-agosto y octubre los valores estuvieron por sobre la media. El volumen máximo se alcanzó a mediados de julio con aproximadamente 320 millones de km<sup>3</sup> (Figura 15).




Figura 15. Volumen de Nubes Estratosféricas Polares, Tipo I. Fuente: NASA

# OZONO ESTRATOSFÉRICO Y RADIACIÓN ULTRAVIOLETA AÑO 2022

## 4. Consecuencias del agotamiento de ozono en la radiación UV

La Figura 16 muestra que en los meses de septiembre y noviembre la disminución de Ozono no tuvo gran impacto en el aumento de los valores de Índice Ultravioleta. Los aumentos que se produjeron en las distintas ciudades del país están más bien asociados a las condiciones naturales durante la época, donde los valores de Índice UV aumentaron acorde a la estacionalidad de la zona.

Por su parte, en el mes de octubre, entre los días 11 y 12, el paso de una elongación del Agujero de Ozono sobre Punta Arenas elevó los valores de Índice Ultravioleta entre 1 y 2 unidades por sobre lo esperado, alcanzando 7 unidades de índice UV (rango Alto).

Pese al gran tamaño y profundidad que ha alcanzado el Agujero de Ozono durante su ciclo 2022, esto no tuvo impacto en el aumento de los valores de Índice Ultravioleta en las ciudades del sur del país. Los registros alcanzados en rangos Muy Alto y Extremo son acordes a la época del año.





Figura 16. Valores de Índice Ultravioleta durante septiembre a noviembre de 2022 en ciudades del sur del país. Fuente: DMC

## 5. Observaciones generales

los valores del área del Agujero de Ozono estuvieron en torno a valores normales de su ciclo hasta fines de agosto, sin embargo durante septiembre, octubre y parte de noviembre se ha manifestado mucho más grande de lo habitual, bordeando los 20 millones de km<sup>2</sup> a comienzos de noviembre, valor que es muy alto para la época. Esta situación es muy similar al ciclo registrado durante los años 2020 y 2021. Por otro lado, el proceso de cierre fue lento y tardío.

En general las **temperaturas estuvieron por debajo de los valores normales, incluso por momentos acercándose a valores mínimos históricos para la época**, situación que condicionó directamente en la evolución del Agujero de Ozono 2022.

La Figura 17 muestra la evolución del agujero durante el año 2022, los tonos azules corresponden al área donde los valores de columna total de ozono están por debajo las 220 DU, umbral que define el área del agujero de ozono.

Durante octubre, noviembre y diciembre todas las condiciones fueron favorables para que el agujero de ozono se mantuviera con un área mayor de lo habitual, y además, extendiera su ciclo hasta fines de diciembre. **Desde octubre en adelante, los valores del tamaño del agujero se mantuvieron por sobre el percentil 90, incluso cercano a los registros históricos en algunos períodos de su ciclo.**




Figura 17. Columna de ozono total para los días  
1) 01-agosto, 2) 15-agosto, 3) 30-agosto,  
4) 01-septiembre, 5) 15-septiembre, 6) 01-octubre,  
7) 15-octubre, 8) 31-octubre, 9) 02-noviembre,  
10) 15-noviembre, 11) 30-noviembre y 12) 15-diciembre  
de 2022. Fuente: NASA.

### 6. Referencias

- Fahey, D. *Veinte Preguntas y Respuestas sobre la Capa de Ozono*. Documento basado, en la evaluación científica del agotamiento de ozono 2002, NOAA.
- Ozone Hole Watch. National Aeronautics and Space Administration. Goddard Space Flight Center  
<https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/meteorology/>
- <https://atmosphere.copernicus.eu/monitoring-ozone-layer>
- Red Radiométrica DMC. Datos de Índice UV.
- Total Ozone Mapping Spectrometer-Earth Probe (TOMS-EP), NASA. Datos de columna de ozono diarios.
- <https://blog.meteochile.gob.cl/>

