

Boletín de Tendencias Climáticas Chile

Edición de septiembre 2026
Publicado: 30/09/2026

N°233

Debilitamiento de los vientos alisios:

La clave de un evento de El Niño aún en intensificación ^{p.1}

Pronóstico trimestral de precipitación:

zona centro y centro-sur con condición sobre lo normal, mientras que parte del altiplano y la zona austral se proyecta bajo lo normal. ^{p.3}

Pronóstico trimestral de temperatura:

Temperaturas mínimas sobre lo normal en el norte y centro, y predominio de máximas en rangos normales y bajo lo normal en la zona centro-sur y austral. ^{p.4}

Debilitamiento de los vientos alisios:

LA CLAVE DE UN EVENTO DE EL NIÑO AÚN EN INTENSIFICACIÓN

Mientras Chile cierra un invierno 2026 marcado por récords de precipitación, en el Pacífico ecuatorial lo precedía un cambio en los vientos, que es menos visible pero de gran alcance. Los vientos alisios son uno de los motores del clima global y llevan casi seis meses debilitados. Ese debilitamiento explica por qué El Niño no solo se mantiene, sino que sigue intensificándose.

¿Qué son los vientos alisios?

Los alisios son vientos persistentes que soplan cerca de la superficie en la franja tropical, desde el este hacia el oeste. En el hemisferio sur llegan desde el sureste y en el hemisferio norte desde el noreste. Se originan por el contraste entre las altas presiones subtropicales, como el Anticiclón del Pacífico Sur frente a nuestras costas, y las bajas presiones cercanas al ecuador. Son de los vientos más constantes del planeta, y justamente por eso son tan importantes y sostienen buena parte del clima global.

La importancia de su condición normal


La figura 1a muestra las condiciones normales, donde los alisios arrastran las aguas superficiales cálidas hacia el Pacífico occidental. Allí, junto a Indonesia, se acumula una gran "piscina cálida" que provoca la humedad y lluvias características en la zona, donde el nivel del mar llega a ser cerca de medio metro más alto que frente a Sudamérica. En el lado oriental ocurre lo contrario: ese arrastre favorece el afloramiento de aguas frías y profundas, ricas en nutrientes, frente a Perú y el norte de Chile. El océano queda "inclinado", con una termoclina profunda al oeste y menos profunda al este.

Sobre ese océano se organiza la Circulación de Walker. El aire asciende con abundantes lluvias sobre Indonesia, viaja hacia el este en altura y desciende seco sobre el Pacífico oriental. Ese descenso refuerza las altas presiones y, con ellas, a los propios alisios. Es un equilibrio que se sostiene a sí mismo.

Durante un evento de El Niño


Los alisios se debilitan y ocurren anomalías que incluso provocan vientos del oeste (fig 1.b). Esto da origen a una onda Kelvin que lleva calor desde el sector de Indonesia hacia Sudamérica, la termoclina se profundiza y provoca un calentamiento del océano en las costas y la surgencia se debilita, provocando un menor enriquecimiento de nutrientes. También, la convección se desplaza al este sobre el Pacífico central, esto se asocia con condiciones lluviosas en Chile central y condiciones secas sobre Indonesia.

a) Condición Normal



- Vientos Alisios empujan agua cálida hacia el oeste.
- Termoclina profunda en el oeste y más superficial al este. Mayor surgencia de agua fría en costas de Sudamérica.
- El aire asciende sobre Indonesia (lluvias) y desciende seco sobre el Pacífico Oriental.

b) Condición durante El Niño



- Vientos Alisios debilitados o invertidos: anomalías de viento del oeste.
- Ondas Kelvin llevan calor al este, la termoclina se aplan y profundiza, por lo que la surgencia disminuye frente a las costas de sudamérica.
- La convección migra al Pacífico ecuatorial central cambiando patrones de precipitación a nivel global.

■ Agua muy cálida
 ■ Capa cálida superficial
 ■ Agua fría profunda
 --- Termoclina
 — Circulación atmosférica
 — Anomalía de viento del oeste
 A / B Alta / baja presión en superficie

Figura 1: Circulación de Walker en el Pacífico ecuatorial: a) condición normal; b) durante El Niño, con alisios debilitados, calentamiento hacia el este y convección desplazada al Pacífico central. [Fuente: Elaboración propia].

Debilitamiento de los vientos alisios:

LA CLAVE DE UN EVENTO DE EL NIÑO AÚN EN INTENSIFICACIÓN

¿Qué está pasando en 2026?

Desde abril se observan pulsos de anomalías de viento del oeste en el Pacífico ecuatorial central (Figura 2), es decir, alisios más débiles de lo normal. Hubo pulsos intensos en abril, julio y agosto, con anomalías que superaron los 10 m/s. Estos pulsos favorecieron la generación de ondas Kelvin oceánicas, que transportaron calor hacia el este del Océano Pacífico.

En la atmósfera se confirmó el establecimiento e intensidad de este evento de El Niño con varias señales:

- El Índice de Oscilación del Sur, que mide la diferencia de presión entre Tahití y Darwin, se tornó intenso y negativo, reflejando las condiciones de El Niño.
- La convección se desplazó hacia el Pacífico central y oriental modificando los patrones de precipitación y temperaturas en Sudamérica.
- Las lluvias quedaron suprimidas sobre Indonesia y se registró un aumento de precipitaciones en Chile centro-norte y centro-sur.

El debilitamiento de los Alisios se retroalimenta

Este proceso se refuerza a sí mismo, mecanismo conocido como "*retroalimentación de Bjerknes*", donde:

1. Alisios más débiles reducen el afloramiento de aguas frías, y el Pacífico oriental se calienta.
2. El calentamiento disminuye el contraste de temperatura y de presión entre el este y el oeste.
3. Ese menor contraste debilita aún más los alisios, y el ciclo vuelve a empezar.

Las cifras de agosto lo reflejan. La región Niño 3.4 pasó de +2,03 °C en julio a +2,52 °C en agosto. También, las regiones Niño 3 (+3,13 °C) y Niño 1+2 (+4,08 °C) muestran un calentamiento persistente en la costa sudamericana.

La atmósfera responde y la convección se mantiene desplazada hacia el Pacífico central

La radiación de onda larga saliente (OLR) indica cuánta nubosidad convectiva hay y es un indicador de cambios en la circulación atmosférica, cuyas anomalías se muestran en la figura 3. Este dipolo que se observa en la franja ecuatorial confirma los cambios en los patrones de circulación. El desplazamiento de la zona de mayor convección hacia el pacífico central, se asocia con un debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur frente a las costas de Chile, esto se relaciona con la anomalía negativa en Chile (óvalo pequeño), señal de mayor nubosidad compatible con un mayor paso de sistemas frontales.




Figura 2: Anomalías de viento zonal a 850 hPa entre 5°N y 5°S, de abril a septiembre de 2026. Los tonos naranjos indican el debilitamiento de los alisios. [Fuente: CPC/NOAA].





Figura 3: Anomalía de radiación de onda larga saliente (OLR) promediada en 30 días, del 22 de agosto al 20 de septiembre de 2026. Los tonos azules y morados (valores negativos) indican más convección y nubosidad que lo normal, y los tonos amarillos y cafés (valores positivos) indican convección suprimida. Período base: 1991-2020. [Fuente: NOAA/PSL].

Pronóstico trimestral de precipitación:

ZONA CENTRO Y CENTRO-SUR CON CONDICIÓN SOBRE LO NORMAL, MIENTRAS QUE PARTE DEL ALTIPLANO Y LA ZONA AUSTRAL SE PROYECTAN BAJO LO NORMAL.



El pronóstico estacional para el trimestre octubre-noviembre-diciembre (OND) 2026 muestra una condición bajo lo normal en el altiplano de las regiones de Arica y Parinacota y parte del altiplano de Tarapacá. También, desde el extremo norte se extiende la característica condición seca, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la zona costera y norte de la Región de Coquimbo.

Desde el sector sur y cordillerano de la Región de Coquimbo, y hasta la Región de Los Ríos, se proyecta una condición favorable a precipitaciones Sobre lo Normal, lo que indica que podrían registrarse acumulados por sobre el percentil 66 respecto del período climatológico de referencia. Esta señal abarca gran parte de la zona central y centro-sur del país.

Por ejemplo, en la estación meteorológica de Curicó, en la Región del Maule, donde las lluvias del trimestre oscilan normalmente entre los 15 y 47 mm, un pronóstico de categoría "Sobre lo normal" proyecta acumulados de precipitación por sobre los 47 mm para OND, es decir, valores ubicados por encima del percentil 66 del período de referencia.


En la Región de Los Lagos predomina una doble condición Normal o Sobre lo Normal; se diferencia de la condición predominante la estación El Tepual, en Puerto Montt, que presenta una doble condición Normal/Bajo lo normal, es decir, acumulados dentro del rango normal (240 a 347 mm) o inferiores a 240 mm.

Finalmente, en la Región de Aysén se observa la transición de una condición doble Normal/Bajo lo Normal, con acumulados que podrían situarse en rangos normales o menores a ellos a una condición bajo lo normal que se extiende y predomina en la región de Magallanes, lo que proyecta acumulados por debajo del percentil 33; que en la estación de Punta Arenas, cuyo rango normal es de 65 a 80 mm, se proyectan acumulados menores a 65 mm en OND.

Figura 4. Pronóstico Estacional de Precipitación acumulada para el trimestre OND 2026, inicializado en Septiembre 2026. Se muestra el rango de precipitación más probable del trimestre.

Pronóstico trimestral de temperatura:

TEMPERATURAS MÍNIMAS SOBRE LO NORMAL EN EL NORTE Y CENTRO, Y PREDOMINIO DE MÁXIMAS EN RANGOS NORMALES Y BAJO LO NORMAL EN LA ZONA CENTRO-SUR Y SUR-AUSTRAL.



¿Cómo interpretar esta tabla?

En la tabla se aprecia el pronóstico estacional para cada ciudad del país. La segunda columna de la tabla indica el rango normal o climatológico de precipitaciones, es decir, lo que uno esperaría típicamente para este trimestre. Este rango se calcula para el periodo 1991-2020 a partir de las sumas trimestrales de precipitación, donde los percentiles 33 y 66 definen los límites del rango. La última columna indica el pronóstico probabilístico para el trimestre en cuestión según las siguientes categorías.

Categorías de pronóstico estacional

Tomando el ejemplo de diferentes estaciones, a continuación, se muestran las diferentes interpretaciones para los posibles pronósticos.

Condición Bajo lo Normal: Esto implica que la precipitación acumulada en el trimestre debería estar bajo el percentil 33 del rango normal. Por ejemplo, se trataría de montos inferiores a 6 mm para Putre, si presentara la condición Bajo lo normal.

Condición mixta – Bajo lo Normal/Normal: Significa que es altamente probable que cualquiera de las dos categorías se presente. Esto significa que las precipitaciones acumuladas estarán entre el rango Bajo lo Normal (menos del límite inferior del rango normal) o en el rango normal. Para la estación meteorológica de Puerto Montt, esto significa que las precipitaciones acumuladas estarán entre el rango Bajo lo Normal (bajo los 240 mm) o en el rango Normal (entre 240 mm y 347 mm).

Estación Seca: Si el nivel de precipitaciones, a nivel promedio o del percentil 33 es demasiado bajo, se considera estación seca y no se realiza pronóstico.

Indefinido: Este pronóstico indica que no es posible identificar alguna de las categorías de pronóstico, por lo que existe alta incertidumbre.

Condición mixta – Sobre lo Normal/Normal: Significa que es altamente probable que cualquiera de las dos categorías se presente.

Precipitación Acumulada

Estaciones	Rango Normal	Pronóstico Probabilístico para OND
Putre	6 a 19 mm	Bajo lo Normal
Arica Chacalluta Ap.	1 a 9 mm	Estación Seca
Colchane	4 a 13 mm	Indefinido
Camiña	0 a 0 mm	Estación Seca
Iquique Diego Aracena Ap.	0 a 0 mm	Estación Seca
Toconao	0 a 0 mm	Estación Seca
Calama El Loa Ap.	0 a 0 mm	Estación Seca
Antofagasta Cerro Moreno Ap.	0 a 0 mm	Estación Seca
Copiapó	0 a 0 mm	Estación Seca
La Serena - La Florida Ap.	1 a 2 mm	Estación Seca
Ovalle	0 a 1 mm	Estación Seca
Combarbalá	0 a 2 mm	Estación Seca
Los Vilos	0 a 5 mm	Estación Seca
La Ligua	0 a 6 mm	Estación Seca
Los Andes	0 a 17 mm	Estación Seca
Quillota	0 a 11 mm	Estación Seca
Valparaíso - Punta Angeles	2 a 11 mm	Sobre lo Normal
Rodelillo	5 a 23 mm	Sobre lo Normal
Santo Domingo	4 a 19 mm	Sobre lo Normal
Santiago - Pudahuel Ap.	3 a 15 mm	Sobre lo Normal
Santiago - Qta. Normal	4 a 21 mm	Sobre lo Normal
Melipilla	3 a 17 mm	Sobre lo Normal
Rancagua	10 a 32 mm	Sobre lo Normal
San Fernando (Fundo El Carmen)	15 a 44 mm	Sobre lo Normal
Curicó - General Freire Ad.	15 a 47 mm	Sobre lo Normal
Talca (UC)	20 a 63 mm	Sobre lo Normal
Cauquenes	22 a 62 mm	Sobre lo Normal
Chillán - Bdo. Ohiggins Ad.	61 a 123 mm	Sobre lo Normal
Concepción Carriel Sur Ap.	60 a 111 mm	Sobre lo Normal
Los Ángeles	80 a 139 mm	Sobre lo Normal
Temuco - Maquehue Ad.	122 a 205 mm	Sobre lo Normal
Villarrica	234 a 413 mm	Sobre lo Normal
Valdivia - Pichoy Ad.	174 a 306 mm	Sobre lo Normal
Osorno - Cañal Bajo Ad.	158 a 218 mm	Sobre lo Normal
Puerto Montt - El Tepual Ap.	240 a 347 mm	Normal/Bajo lo Normal
Quellón	270 a 366 mm	Bajo lo Normal
Futaleufú - Aeródromo	312 a 445 mm	Normal/Bajo lo Normal
Coyhaique - Tte. Vidal Ap.	139 a 221 mm	Bajo lo Normal
Balmaceda - Aeródromo	72 a 102 mm	Bajo lo Normal
Punta Arenas - Carlos Ibáñez Ap.	65 a 80 mm	Bajo lo Normal
Puerto Williams - Aeródromo	123 a 148 mm	Normal/Bajo lo Normal

Agradecemos a las instituciones que mensualmente nos entregan información para realizar este pronóstico: ESVAL S.A., Minera CODELCO ANDINA, INIA, Servicio Meteorológico de la Armada (SERVIMET) y la Dirección General de Aguas (DGA).



Temperatura Máxima

Estaciones	Rango Normal	Pronóstico Probabilístico para OND
Putre	16 a 17 °C	Sobre lo Normal
Iquique	21 a 22 °C	Sobre lo Normal
Copiapó	25 a 26 °C	Sobre lo Normal
La Serena - La Florida Ad.	18 a 19 °C	Sobre lo Normal
Ovalle Escuela Agrícola	24 a 25 °C	Normal/Sobre lo Normal
Illapel (DGA)	25 a 26 °C	Sobre lo Normal
La Cruz	25 a 26 °C	Normal/Sobre lo Normal
Quillota	24 a 25 °C	Normal/Sobre lo Normal
Valparaíso	18 a 19 °C	Sobre lo Normal
Rodelillo	20 a 21 °C	Sobre lo Normal
Santo Domingo Ad.	18 a 19 °C	Sobre lo Normal
Santiago - Pudahuel	26 a 27 °C	Bajo lo Normal
Santiago - Quinta Normal	26 a 27 °C	Bajo lo Normal
Pirque	22 a 23 °C	Bajo lo Normal
Melipilla	21 a 22 °C	Bajo lo Normal
Curicó	24 a 25 °C	Bajo lo Normal
Chillán	23 a 24 °C	Bajo lo Normal
Concepción - Carriel Sur Ad.	18 a 19 °C	Normal/Sobre lo Normal
Diguillín	19 a 21 °C	Bajo lo Normal
Temuco - Maquehue	19 a 20 °C	Normal/Bajo lo Normal
Puerto Saavedra	16 a 17 °C	Indefinido
Pucón	19 a 20 °C	Bajo lo Normal
Valdivia - Pichoy Ad.	19 a 20 °C	Bajo lo Normal
Osorno	18 a 19 °C	Normal/Bajo lo Normal
Puerto Montt - El Tepual	16 a 17 °C	Indefinido
Futaleufú	17 a 18 °C	Bajo lo Normal
Puerto Aysén Ad.	14 a 15 °C	Bajo lo Normal
Coyhaique Alto	14 a 15 °C	Bajo lo Normal
Balmaceda	15 a 16 °C	Sobre lo Normal
Puerto Natales	11 a 12 °C	Indefinido
Punta Arenas Ad.	12 a 13 °C	Bajo lo Normal
Puerto Williams - Aeródromo	11 a 12 °C	Bajo lo Normal

Temperatura Mínima


Estaciones	Rango Normal	Pronóstico Probabilístico para OND
Putre	3 a 4 °C	Sobre lo Normal
Iquique	16 a 17 °C	Sobre lo Normal
Copiapó	10 a 11 °C	Sobre lo Normal
La Serena - La Florida Ad.	10 a 11 °C	Sobre lo Normal
Ovalle Escuela Agrícola	9 a 10 °C	Indefinido
Illapel (DGA)	9 a 10 °C	Sobre lo Normal
La Cruz	8 a 9 °C	Sobre lo Normal
Quillota	8 a 9 °C	Normal/Sobre lo Normal
Valparaíso	11 a 12 °C	Sobre lo Normal
Rodelillo	10 a 11 °C	Sobre lo Normal
Santo Domingo Ad.	8 a 9 °C	Indefinido
Santiago - Pudahuel	9 a 10 °C	Sobre lo Normal
Santiago - Quinta Normal	10 a 11 °C	Sobre lo Normal
Pirque	5 a 6 °C	Normal/Sobre lo Normal
Melipilla	8 a 9 °C	Sobre lo Normal
Curicó	10 a 11 °C	Indefinido
Chillán	8 a 9 °C	Indefinido
Concepción - Carriel Sur Ad.	8 a 9 °C	Sobre lo Normal
Diguillín	6 a 7 °C	Bajo lo Normal
Temuco - Maquehue	6 a 7 °C	Bajo lo Normal
Puerto Saavedra	8 a 9 °C	Normal/Bajo lo Normal
Pucón	7 a 8 °C	Indefinido
Valdivia - Pichoy Ad.	7 a 8 °C	Bajo lo Normal
Osorno	6 a 7 °C	Normal/Bajo lo Normal
Puerto Montt - El Tepual	7 a 8 °C	Normal/Bajo lo Normal
Futaleufú	6 a 7 °C	Bajo lo Normal
Puerto Aysén Ad.	7 a 8 °C	Bajo lo Normal
Coyhaique Alto	2 a 3 °C	Bajo lo Normal
Balmaceda	3 a 4 °C	Bajo lo Normal
Puerto Natales	4 a 5 °C	Bajo lo Normal
Punta Arenas Ad.	4 a 5 °C	Bajo lo Normal
Puerto Williams - Aeródromo	3 a 4 °C	Bajo lo Normal

Agradecemos a las instituciones que mensualmente nos entregan información para realizar este pronóstico: ESVAL S.A., Minera CODELCO ANDINA, INIA, Servicio Meteorológico de La Armada (SERVIMET) y la Dirección General de Aguas (DGA).



Rangos Normales calculados con el periodo climatológico 1991-2020.

Precipitación Acumulada



Estaciones	Rango Normal	Pronóstico Probabilístico para octubre
Putre	0 a 0 mm	Estación Seca
Arica Chacalluta Ap.	0 a 0 mm	Estación Seca
Colchane	0 a 0 mm	Estación Seca
Camiña	0 a 0 mm	Estación Seca
Iquique Diego Aracena Ap.	0 a 0 mm	Estación Seca
Toconce	0 a 0 mm	Estación Seca
Calama El Loa Ap.	0 a 0 mm	Estación Seca
Antofagasta Cerro Moreno Ap.	0 a 0 mm	Estación Seca
Copiapó	0 a 0 mm	Estación Seca
La Serena - La Florida Ap.	0 a 1 mm	Estación Seca
Ovalle	0 a 0 mm	Estación Seca
Combarbalá	0 a 0 mm	Estación Seca
Los Vilos	0 a 3 mm	Estación Seca
La Ligua	0 a 1 mm	Estación Seca
Los Andes	0 a 7 mm	Estación Seca
Quillota	0 a 6 mm	Estación Seca
Valparaíso - Punta Angeles	0 a 8 mm	Estación Seca
Rodelillo	1 a 12 mm	Estación Seca
Santo Domingo	1 a 12 mm	Sobre lo Normal
Santiago - Pudahuel Ap.	0 a 7 mm	Estación Seca
Santiago - Qta. Normal	1 a 12 mm	Sobre lo Normal
Melipilla	2 a 10 mm	Sobre lo Normal
Rancagua	5 a 22 mm	Sobre lo Normal
San Fernando (Fundo El Carmen)	5 a 25 mm	Sobre lo Normal
Curicó - General Freire Ad.	5 a 24 mm	Sobre lo Normal
Talca (UC)	10 a 30 mm	Sobre lo Normal
Cauquenes	13 a 31 mm	Sobre lo Normal
Chillán - Bdo. Ohiggins Ad.	34 a 66 mm	Sobre lo Normal
Concepción Carriel Sur Ap.	31 a 54 mm	Sobre lo Normal
Los Ángeles	38 a 86 mm	Sobre lo Normal
Temuco - Maquehue Ad.	46 a 87 mm	Sobre lo Normal
Villarrica	99 a 174 mm	Sobre lo Normal
Valdivia - Pichoy Ad.	67 a 117 mm	Sobre lo Normal
Osorno - Cañal Bajo Ad.	61 a 98 mm	Sobre lo Normal
Puerto Montt - El Tepual Ap.	87 a 144 mm	Normal/Sobre lo Normal
Quellón	85 a 142 mm	Normal/Sobre lo Normal
Futaleufú - Aeródromo	93 a 163 mm	Bajo lo Normal
Coyhaique - Tte. Vidal Ap.	40 a 80 mm	Bajo lo Normal
Balmaceda - Aeródromo	23 a 37 mm	Normal/Sobre lo Normal
Punta Arenas - Carlos Ibáñez Ap.	20 a 29 mm	Bajo lo Normal
Puerto Williams - Aeródromo	23 a 56 mm	Indefinido


Agradecemos a las instituciones que mensualmente nos entregan información para realizar este pronóstico: ESVAL S.A., Minera CODELCO ANDINA, INIA, Servicio Meteorológico de La Armada (SERVIMET) y la Dirección General de Aguas (DGA).



(*) Este pronóstico es experimental y está en constante desarrollo. Para revisar detalles de los montos de precipitación revisar la tabla. Este pronóstico no es capaz de predecir eventos extremos de precipitación en el periodo analizado.

Figura 6. Pronóstico Subestacional de Precipitación acumulada para octubre 2026, inicializado en septiembre 2026. Se muestra el rango de precipitación más probable del mes.


- Para realizar este pronóstico, se utilizan 4 modelos dinámicos de escala global y 2 estadísticos forzados con la temperatura superficial del mar, ajustados con análisis de correlación canónica (CCA) y datos homogenizados (DGA–DMC–AGROCLIMA) para 212 estaciones de precipitación.
- Estos modelos dinámicos y estadísticos consideran las influencias de: El Niño/La Niña, la temperatura superficial del mar del Océano Pacífico Occidental y Sur, oscilaciones intraestacionales (como la Oscilación Madden-Julian), las tendencias de largo plazo y el cambio climático.
- Cada modelo resulta en una probabilidad distinta según las categorías de pronóstico. Para obtener una única probabilidad por categoría y estación, se pondera cada resultado de acuerdo a la habilidad del modelo en el periodo de entrenamiento. Los modelos con mayor habilidad pesan más que los modelos de baja habilidad.
- Para definir la categoría final, se toma en consideración el siguiente análisis. Si alguna de las categorías absolutas (Normal, Bajo lo Normal o Sobre lo Normal) supera el 47% por sí sola, esta será el pronóstico final.



En este caso, la categoría **Sobre lo Normal** es la más alta entre todas y, a su vez, supera el 47%.


Por lo tanto, el pronóstico para este ejemplo es **Sobre lo Normal**.

- Si ninguna categoría suma más de 47%, pero la probabilidad más alta es superior a 37%, se establece que se debe sumar la categoría siguiente que más peso de al resultado, obteniéndose dos categorías potenciales: **Normal o Bajo lo Normal**, y **Normal o Sobre lo Normal**.



Puesto que la categoría de mayor probabilidad (bajo lo normal) no supera el umbral de 47% pero es mayor a 37%, se le suma la categoría normal. De esta forma se obtiene un resultado mixto con alta probabilidad, pero con **mayor incertidumbre**.

- Si ninguna categoría sobrepasa el 37% por sí sola, se considera un pronóstico **indefinido**.



Cuando ninguna de las tres categorías supera el 37% de probabilidad por sí sola, se considera que cualquiera de las 3 categorías es igual de probables de ocurrir. Esta indefinición es parte de la incertidumbre del pronóstico S2S.